

## 美作市 子ども向け定期予防接種一覧表(令和2年10月1日現在)

ワクチン名	対象期間(無料で受けられる期間)	(おおすすめの時期) 回数・接種間隔	
ロタウイルス(1価)	生後6週から24週0日	(初回14週6日後までに初回接種) 2回 接種ごとの間隔: 27日以上をあける	
ロタウイルス(5価)	生後6週から32週0日	(初回14週6日後までに初回接種) 3回 接種ごとの間隔: 27日以上をあける	
B型肝炎	生後1歳未満	(生後2か月～生後9か月未満) 1回目・2回目: 27日以上の間隔をあける 3回目: 1回目の接種から139日以上あける	
Hib(ヒブ)	生後2か月から生後60か月未満	(生後2か月～生後7か月未満) 初回: 3回 接種ごとの間隔: 27日～56日をあける ----- (初回終了後7月～13月未満の間隔をあけて) 追加: 1回	生後7か月以降に接種を始める場合は下の①を見てください。
小児肺炎球菌	生後2か月から生後60か月未満	(生後2か月～生後7か月未満) 初回: 3回 接種ごとの間隔: 27日以上をあける ----- (生後12か月～生後15か月未満) 追加: 1回	生後7か月以降に接種を始める場合は下の②を見てください。
4種混合 (ジフテリア・破傷風 百日せき・ポリオ)	生後3か月から生後90か月未満	(生後3か月～生後12か月未満) 1期初回: 3回 接種ごとの間隔: 20日～56日をあける ----- (1期初回終了後12月～18月未満の間隔をあけて) 1期追加: 1回	
BCG(結核)	生後1歳未満	(生後5か月～生後8か月未満) 1回	
水痘(水ぼうそう)	生後12か月から生後36か月未満	(生後12か月～生後15か月未満) 1回目 ----- (1回目終了後6月～12月未満の間隔をあけて) 2回目	
麻しん風しん(MR)	1期: 生後12か月から24か月未満	(生後12か月～24か月未満) 1期: 1回	
	2期: 小学校入学の前年度	(小学校入学の前年度(保育園・幼稚園の年長にあたる年)) 2期: 1回	
日本脳炎	1期: 生後6か月から生後90月未満	(3歳～4歳未満) 1期初回: 2回 接種ごとの間隔: 6日～28日をあける ----- (1期初回終了後おおむね1年の間隔をあけて) 1期追加: 1回	
		(9歳～10歳未満) 2期: 1回	
	2期: 9歳以上13歳未満	日本脳炎予防接種の特例措置	
	平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方		4歳以上20歳未満までが対象期間となります。
平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれの方で、1期が完了していない方		2期の期間に、接種していない1期の予防接種も受けることができます。	
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期: 11歳以上13歳未満	(11歳～12歳未満) 2期: 1回	

### ①ヒブ予防接種を生後7か月以降に始められた方

接種開始時期	生後7か月～生後12か月未満	生後12か月～生後60か月未満
おおすすめの時期・回数 接種間隔	(生後7か月～生後12か月未満) 初回: 2回 接種ごとの間隔: 27日～56日をあける ----- (初回終了後7月～13月未満の間隔をあけて) 追加: 1回	1回

### ②小児肺炎球菌予防接種を生後7か月以降に始められた方

接種開始時期	生後7か月～生後12か月未満	生後12か月～生後24か月未満	生後24か月～生後60か月未満
おおすすめの時期・回数 接種間隔	(生後7か月～生後12か月未満) 初回: 2回 接種ごとの間隔: 27日以上をあける ----- (生後12月以降、初回終了後60日以上の間隔をあけて) 追加: 1回	2回 接種ごとの間隔: 60日以上	1回

・現在積極的な接種勧奨を控えている予防接種(接種にあたっては有効性とリスクを理解したうえで受けてください。)

ワクチン名	対象期間(無料で受けられる期間)	おおすすめの時期・回数・接種間隔
ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん) ※2価・4価のうち、どちらかを接種してください。	小学6年生から 高校1年生相当年齢の女子	(中学校3年生のとき) ----- 2価ワクチン(サーバリックス): 3回 ----- 4価ワクチン(ガーダシル): 3回